2023年

かわむら小児科

公式 LINE



をでをくらび



子宮頸がん予防ワクチンについて

子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種は、平成25年6月14日より、積極的な接種勧奨が差し控えられていましたが、ようやく昨年4月から積極的勧奨が再開されることになりました。対象年齢を過ぎてしまった女性(平成9年度から平成18年度生まれ)への公的接種も3年間という期間で行われていますが、あと1年4か月しかありません。15歳以上の方は6か月の間に3回接種が必要ですのであと10か月までの間に接種をしないと間に合いません。期間を過ぎると3回接種で約10万円のお金がかかります。

日本では副反応かと思われるけいれんや麻痺の 映像がマスコミで何回も流されました。ただ、世界でも 多くの国で同じワクチンを使っていますが、そのような 副反応が言われているのは日本だけです。名古屋ス タディという調査ではワクチンと副反応の関係はない ことが証明されました。当院でも受けられた方で症状 が出た方はおられません。もし万が一ひどい症状が 出た場合には救済(医療費、障害年金等)が受けられることになっています。

日本では毎年1万1000人の女性が新たに子宮頸がんと診断され、毎年約3,000人の方が子宮頸がんで亡くなっています。特に20代から30代の出産年齢の方で増えています。子宮頸がんは性交渉でヒトパピローマウイルスがうつる病気です。子宮頸がん予防ワクチンは安全性が高く、扁平コンジローマの発症予防にも効果があるワクチンです。

副反応を恐れず、接種することが重要と思っています。

・感染症情報(12月1日現在)*

- ★インフルエンザA型の流行が続いています。コロナ も少しずつですがずっと見られています。
- ★アデノウイルス、溶連菌が流行している園や学校 もあります。
- ★ノロウイルスと思われる胃腸炎も少し見られます。

おむつかぶれ

おむつかぶれは、陰部がおむつに覆われて蒸し風呂のようなじっとりした環境でおしっこやうんちによる刺激が加わって、ちょっと擦っただけですぐに皮膚が傷んでしまって起こります。きれいにしようとするあまり、擦り過ぎてしまうと、かえって悪化させてしまいます。

【対策】

- おしっこやうんちをふき取る時ときは、力を入れず優しく拭くようにします。
- 市販のおしり拭きではなく、陰部を霧吹きなどで洗い、コットンで優しく拭いてあげるようにしましょう。

治らなかったり悪化するようなら受診されると よいでしょう。

(こまさん)

あのね、サンタの国ではね…

作: 嘉納 純子 絵: 黒井 健

クリスマスに良い子のみんなにプレゼントを届けてくれるサンタクロース。サンタさんはクリスマス以外はどんなふうに過ごしているのでしょうか?

1年かけてクリスマスの準備をするサンタさんたちの様子が描かれた1冊です。 (ぷりん)



休診のお知らせ

12/30(土)午後~1/3(水)

年末年始のため休診