2025年

かわむら小児科

公式 LINE

モ〜モ〜くらぶ

インフルエンザワクチンについて

ワクチンは接種してから2週間ぐらいから免疫が
でき始め、4週でピークに達します。その後効果は5
ヶ月間ぐらい持続すると言われています。ただし、
子どもでの有効率は20〜30%ぐらいですので、接
種していてもかかることはあります。

生後6ヶ月以降で接種可能です。ただし、1歳未満
では接種しても効果がない(あまり免疫ができない)
のであまりお勧めしていません。家族の方が受けら
れるとよいと思います。

13歳未満の子では基本的には2回接種(3週から
4週間隔がベスト)ですが、小学生で以前に受けて
いる子であれば1回接種でも効果は2回接種と変わ
らないということがわかりはじめたので、1回でもよ
いかと思います。3歳以上で前年に受けている子で
あれば1回でも効果ありというデータもあります。

経鼻の生ワクチン(商品名フルミスト)も販売され
ていますが、効果や副反応がまだよくわからないた
め、今年も不活化ワクチンの皮下注射のみ行いま
す。今年もコロナ感染予防のため、診療時間とイン
フルエンザワクチン接種時間を分けました。詳細は
予約画面をご覧ください。

.....感染症情報(9月1日現在).....

- ★新型コロナウイルスが先月から増えています。
インフルエンザA型も出ているようです。
- ★百日咳、マイコプラズマ、溶連菌、RSウイルス、
ヘルパンギーナ、りんご病も少しずつ見られます。

★休診のお知らせ

9月13日(土)午後・9月27日(土)

★インフルエンザ予防接種の予約を開始しました

下記のアドレスまたは QR コードからご予約ください

<https://www.shujii.com/0834320535/i/>

子どもの肥満

食欲の秋と言われる季節が訪れますが、肥満
は子どもの頃から高血圧、睡眠時無呼吸症候
群、2型糖尿病、脂質異常症、脂肪肝などの生
活習慣病を引き起こします。

また、いじめの標的にされやすく、自分の容姿
に自信が持てずうつ状態に陥るなど、心にも
影響することがあります。

肥満になりやすい食習慣

- エネルギーの過剰摂取
- 偏食(野菜嫌い)
- 遅い時刻の夕食摂取
- 早食い

将来肥満になりやすい生活習慣

- 果糖を含む甘い飲料(ジュース類)を日常的
に飲む
- 朝食を食べない
- 油っこい料理を好む
- 身体活動量が少なく、スクリーンタイムが長い
- 睡眠時間が短い

子どもの肥満は成人肥満に移行しやすいの
で、子どものうちから生活習慣を見直し、予防し
ましょう。(ラビー)

おにぎりくんがね..

作・絵:とよた かずひこ

おにぎりくんたちは自分で自分をにぎります。
「にぎにぎぎゅつぎゅつ、にぎにぎぎゅー」
おいしそうな3つのおにぎり。身近な食べ物が
動き出す楽しい絵本です。(ピノ)