


2025年



かわむら小児科

モ〜モ〜くらぶ

公式 LINE



子宮頸がん予防ワクチン

子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種は、現在積極的勧奨が再開されています。小学6年生から高校1年生までの女子が公費で受けることができます。高校1年生は来年3月末までです。標準的なスケジュールですと3回接種で6か月かかるのですが、短縮スケジュールだと4か月で3回接種可能です。まだ間に合います！接種対象年齢を超えて自費で接種すると3回で約10万円のお金がかかります。

日本では以前、副反応かと思われるけいれんや麻痺の映像がマスコミで何回も流されました。ただ、世界でも多くの国で同じワクチンを使っていますが、そのような副反応が言われているのは日本だけです。名古屋スタディや厚労省の研究でワクチンと副反応の関係はなかったことが証明されています。安全性は高いワクチンです。

日本では毎年1万人の一人の女性が新たに子宮頸がんと診断され(2クラスに一人ぐらいです)、毎年3,000人の方が子宮頸がんで亡くなっています(9クラスに一人ぐらいです)。特に20代から30代の出産年齢の方で増えています。子宮頸がんは性交渉でヒトパピローマウイルスがうつる病気です。子宮頸がんや扁平コンジローマの発症予防に効果も非常にあるワクチンで、東京都では男子にも接種に助成が出ています。

・・・感染症情報(10月1日現在)・・・

- ★新型コロナウイルス(ニンバス株)、溶連菌、RSウイルス感染症、アデノウイルス感染症などいろいろな病気が見られています。
- ★インフルエンザは都会では流行してきているようですが、このあたりではまだあまり見られません。

遊びの中での事故

【乳幼児揺さぶられ症候群】

新生児～生後6カ月の赤ちゃんは首の周囲の筋肉が未発達で、激しく揺さぶられなくても上下左右の急な動きが脳への負担になって、脳出血や眼底出血を起こすことがあります。

【窒息】

スーパーやコンビニの袋などを頭からかぶって遊ぶと、息を吸ったときに鼻や口を塞いでしまいます。

【誤飲】

ままごとや大人の真似をするなかで、医薬品や化粧品、洗剤、タバコを口にすることがあります。おもちゃに使われる電池や小さな部品にも気をつけましょう。

【のどの突き刺し】

口に物を入れたまま歩いたり走ったりすると、ぶつかったり転んだりした時に口内を切ったりのどを突いたりします。ペンや歯ブラシ、箸、フォーク、おもちゃの棒などに注意しましょう。

(ゆっけ)

どうぞのいす

作:香山美子 絵:柿本幸造

うさぎさんが森に置いた「どうぞのいす」。動物たちが次の誰かを思って譲り合っていきます。優しさが広がっていくあたたかい絵本です。

(いちご)

